

Во втором триместре, а именно в 18-20,6 недель проводится второе скрининговое исследование. Кровь уже не сдается, поэтому приезжать натощак не нужно.



Что можно оценить на втором скрининге?

Будущий ребенок уже подросток, многие структуры и органы видно гораздо лучше. Это позволяет исключить пороки сердца, лица, в этом сроке уже сформировался головной мозг и многое другое. Обязательно оценивается вес, и хотя рост уже не измерить, измеряется длина косточек и соотносится с нормативами, как и другие измерения. Половые органы также уже сформировались, и врач постарается определить пол малыша. Расположение плаценты, количество околоплодных вод, длина шейки матки – обязательные составляющие второго скрининга.

Если вы попали в группу высокого риска по акушерским осложнениям, то необходимо будет выполнить УЗИ в 30-33,6 недель. Врач также оценит анатомию малыша и как он растет, проведет оценку кровотока у плода и в плаценте.



В 34-35,6 недель ультразвуковое исследование проводится с целью исключения поздно проявляющихся пороков развития. К счастью, они выявляются редко. Но поскольку ультразвук безопасный метод, лучше убедиться,



Центр общественного
здоровья и медицинской
профилактики



Клинико-диагностический
центр «Охрана здоровья
матери и ребенка»



profilaktica.ru

Центр общественного
здоровья и медицинской
профилактики



Флотская 52.рф
Клинико-диагностический
центр «Охрана здоровья
матери и ребенка»

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

скрининги во время беременности

